



## Adrenalin intramuskulär inj

(ex Emerade) förfylld injektionspenna

**Emerade penna kan kräva större kraft än normalt för att aktiveras.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:  
Emerade 150, 300 och 500 mikrog  
EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog  
Jext 150 och 300 mikrog  
Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

### ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion: Ska injiceras i lårets främre, övre, yttre kvadrant.  
Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.  
Kan ges genom kläder.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

0,15 mg/dos, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna  
HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen, Emerade och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men det behöver inte Jext.  
Infomationen gäller alla styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Anafylaxi

Barn under 20 kg: 150 mikrog/dos = 0,15 mg/dos  
Barn 20 - 60 kg: 300 mikrog/dos = 0,3 mg/dos  
Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog/dos = 0,3 - 0,5 mg/dos

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

### ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i Fass, vid utfärdande av recept skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

För Emerade injektionspenna kan större kraft än normalt krävas för att pennan ska aktiveras.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket Nyhet: Fortsatta problem med Emerade adrenalinpenna

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/uppdatering-om-aktiveringsfel-gallande-emerade-adrenalinlosning-aktiveringspenna>

Internetadress VISS Akut astma hos barn och ungdomar - behandling i primärvården Åtgärder vid anafylaxi (Stockholms läns landsting)

[http://www.viss.nu/Global/Bilagor/akut/Atgarder\\_vid\\_anafylaxi.pdf](http://www.viss.nu/Global/Bilagor/akut/Atgarder_vid_anafylaxi.pdf)

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation ,(Grade 1A)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling

[http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi\\_sept\\_2015.pdf](http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf)



## Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-03-04

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-04

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**