



Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna

Emerade penna kan kräva större kraft än normalt för att aktiveras.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:
Emerade 150, 300 och 500 mikrog
EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog
Jext 150 och 300 mikrog
Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion: Ska injiceras i lårets främre, övre, yttre kvadrant.
Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.
Kan ges genom kläder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

0,15 mg/dos, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna
HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen, Emerade och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men det behöver inte Jext.
Informationen gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anafylaxi

Barn under 20 kg: 150 mikrog/dos = 0,15 mg/dos
Barn 20 - 60 kg: 300 mikrog/dos = 0,3 mg/dos
Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog/dos = 0,3 - 0,5 mg/dos

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i Fass, vid utfärdande av recept skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

För Emerade injektionspenna kan större kraft än normalt krävas för att pennan ska aktiveras.



Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läke medelsverket Nyhet: Fortsatta problem med Emerade adrenalinpenna

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/uppdatering-om-aktiveringsfel-gallande-emerade-adrenalinlosning-aktiveringspenna>

Internetadress VISS.nu Kunskapsstöd för primärvården: Åtgärder vid anafylaxi (Region Stockholm)

<https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/atgarder-vid-anafylaxi>

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation (Grade 1A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-02-12

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-02-12

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-02-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT