

NORadrenalin intravenös inf

Spädning till Noradrenalin 4 mikrog/mL

Barn 1-2 kg

OBS! Olika slutkoncentrationer vid infusionsstart beroende på barnets vikt.

En-stegsspädning:	Noradrenalin		Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9		INF
Barn 1-2 kg	1 mg/mL	+	mg/mL	=	4 mikrog/mL
	0,2 mL		49,8 mL		50 mL

Hållbarhet preparat:

Noradrenalin (registrerad produkt)

- 4 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: Byt dropp 12 tim efter iordningställande. Vid användning av in-line filter 0,22 um kan byte ske 24 tim efter iordningställande.

Rimlig dos för barn		1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
	0,02 mikrog/kg/min	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim	3 mL/tim	15 mL/tim
	0,3 mikrog/kg/min	4,5 mL/tim	22,5 mL/tim	45 mL/tim	225 mL/tim

För mer information om läkemedlet klicka nedan

SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3278.pdf>

Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278.pdf>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-12-19 15:09:34
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:23:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3278-481
ID/spårnummer: 1824
Giltig fr o m: 2016-12-21 10:23:12
Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

