



NORadrenalin intravenös inf

Spädning till 80 mikrog/mL

Olika slutkoncentrationer vid infusionsstart beroende på barnets vikt.

EN-STEGSSPÄDNING till 80 mikrog/mL

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| Noradrenalin | | Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 | | INF |
| 1 mg/mL | + | mg/mL | = | 80 mikrog/mL |
| 4 mL | | 46 mL | | 50 mL |

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Kontinuerlig infusion.

Skall spädas före användning och ges som intravenös infusion via en central venkateter. Infusionshastigheten skall vara kontrollerad via sprutpump eller infusionspump.

Extravasal administrering kan orsaka lokal vävnadsnekros.

Noradrenalin är ljuskänsligt och får inte användas om det har skiftat färg eller innehåller en fällning.

ÖVRIG INFORMATION

Infusionshastigheten med vald slutkoncentration och ordinerad dos måste alltid kontrolleras. Om infusionshastigheten blir för hög skall ett steg starkare slutkoncentration väljas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Noradrenalin (registrerad produkt)

80 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 12 tim rumstemperatur. Infusion kan pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut hypotension.

Nyfödda och barn 0 - 18 år: 0,02 - 0,5 mikrog/kg/min. Dosjustera utifrån effekt.
Vanlig startdos 0,05 - 0,1 mikrog/kg/min

RIMLIG DOS FÖR 80 mikrog/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0,05 mikrog/kg/min | 0,04 mL/tim | 0,19 mL/tim | 0,38 mL/tim | 1,88 mL/tim |
| 0,5 mikrog/kg/min | 0,38 mL/tim | 1,88 mL/tim | 3,75 mL/tim | 18,75 mL/tim |

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed.se, Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2018-05-29

ePedID: 3278-484

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-05-30

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-05-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT