

NORadrenalin intravenös inf

OBS! Olika slutkoncentrationer vid infusionsstart beroende på barnets vikt.

Tillgängliga beredningsformer och spädningar

- Spädning till Noradrenalin 4 mikrog/mL Barn 1-2 kg
SLL: <http://sllaped01.ds.sll.se/eped/3278-481.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278-481.pdf>
- Spädning till Noradrenalin 10 mikrog/mL Barn 2-10 kg
SLL: <http://sllaped01.ds.sll.se/eped/3278-482.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278-482.pdf>
- Spädning till Noradrenalin 40 mikrog/mL Barn 10-20 kg
SLL: <http://sllaped01.ds.sll.se/eped/3278-483.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278-483.pdf>
- Spädning till Noradrenalin 80 mikrog/mL Barn 20-80 kg
SLL: <http://sllaped01.ds.sll.se/eped/3278-484.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278-484.pdf>
- Spädning till Noradrenalin 160 mikrog/mL Barn över 80 kg
SLL: <http://sllaped01.ds.sll.se/eped/3278-485.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3278-485.pdf>

Administreringsätt

Intravenös infusion: Kontinuerlig infusion.

Skall spädas före användning och ges som intravenös infusion via en central venkateter. Infusionshastigheten skall vara kontrollerad via sprutpump eller infusionspump.

Extravasal administrering kan orsaka lokal vävnadsnekros.

Noradrenalin är ljuskänsligt och får inte användas om det har skiftat färg eller innehåller en fällning.

Vanlig indikation och dos

Akut hypotension.

0,02 - 0,3 mikrogram/kg/min. Dosjustera utifrån effekt.

Övrig information

Infusionshastigheten med vald slutkoncentration och ordinerad dos måste alltid kontrolleras. Om infusionshastigheten blir för hög skall ett steg starkare slutkoncentration väljas, oberoende av patientens kroppsvikt.

Referens/Länk

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-12-19 15:09:34
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:23:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3278
ID/spårnummer: 1824
Giltig fr o m: 2016-12-21 10:23:12
Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



NORadrenalin intravenös inf

OBS! Olika slutkoncentrationer vid infusionsstart beroende på barnets vikt.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-12-19 15:09:34
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:23:12
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3278
ID/spårnummer: 1824
Giltig fr o m: 2016-12-21 10:23:12
Utskriftsdatum: 2016-12-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

