

Targocidbehandling + lås, barn över 20 kg

Teicoplanin

Individuell spädning

Exempel: Volym av Targocid 125 mg/mL som ger önskad dos vid spädning**Beredningsinstruktion**

Späd en ampull Targocid 400 mg med 3,2 mL (3,14 mL enligt företaget) vatten för injektionsvätska. Rulla försiktigt injektionsflaskan mellan händerna tills pulvret är helt upplöst. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter. Detta ger Targocid 125 mg/mL.

Dra upp ordinerad dos av den färdigspädda lösningen och blanda med 100 mL natriumklorid 9 mg/mL

Kroppsvikt	Volym vid dos 6 mg/kg
10 kg	0,48 mL till 100 mL
50 kg	2,4 mL till 100 mL

Hållbarhet preparat:

Targocid (Registrerad Produkt)

- 125 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA, Hållbar: Färdigberedd injektionslösning hållbar 24 timmar i kylskåp.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., -

Administreringsätt

Intravenös instillation:

Enlumen: Infundera hela den iordningställda volymen under cirka 30 - 60 min. Låt hela innehållet i aggregatet rinna fram till trevägskranen (utan spoldropp) när påsen är tömd.

OBS! Övervaka detta moment noggrant! Avsluta behandlingen med att stänga av kransystemet. Ytterligare spolning behövs ej!

Dubbellumen: CVK med dubbellumenkateter eller en "tvillingport" (med dubbelkammare) behöver Targocid-lås i båda ingångarna. En del av infusionen ges i den ena kammaren (minst 5 mL), varefter kranen till denna sida stängs. Denna sida har nu sitt Targocid-lås. Resten av lösningen instilleras i den andra kammaren.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-06-16 12:50:09

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-16 12:49:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3280

ID/spårnummer: 748

Giltig fr o m: 2015-06-16 12:50:09

Utskriftsdatum: 2015-06-16

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Targocidbehandling + lås, barn över 20 kg

Teicoplanin

Infektioner i venport/centrala venkateter.

Dag 1: 6 mg/kg x2

Dag 2- ev 14: 6 mg/kg x1

Övrig information

- Det är viktigt att patienten har ett antibiotikalås mellan infusionerna under hela behandlingsperioden för att behandlingen skall lyckas.

- Vid nästa infusionstillfälle spolas systemet på sedvanligt sätt – låset spolas således in i patienten.

- OBS! Inget annat får injiceras efter targocidinstillationen. Om andra injektioner eller infusioner ska administreras ska dessa ges före targocidinstillationen.

- Man behöver normalt inte ta prov för koncentrationsbestämning under behandlingen. Om patienten behandlas med oto- eller nefrotoxiska mediciner (ex. aminoglykosider, cisplatin) bör dock koncentrationsbestämning göras i perifert blodprov.

Referens/Länk

FASS Targocid, Hämtat: 2015-02-11

<http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplid=19950621000119>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-02-11

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-06-16 12:50:09

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-16 12:49:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3280

ID/spårnummer: 748

Giltig fr o m: 2015-06-16 12:50:09

Utskriftsdatum: 2015-06-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

