

Fluenz Tetra intranasalt influensavaccin

Administreringsätt

Nasalt: Samma näspipett används för att ge dos i båda näsborrarna.

Ta bort gummiskyddet, men låt dosuppdelningsclipset sitta kvar.

Placera näspipetten i ena näsborren.

Tryck in kolven med en enda rörelse så snabbt som möjligt tills dosuppdelningsclipset hindrar vidare intryckning.

Ta bort dosuppdelningsclipset.

Spraya i den andra näsborren.

Får förvaras i rumstemperatur i 12 timmar i samband med administrering. Om vaccinet inte använts efter denna 12-timmarsperiod ska det kasseras.

Ingen ny administrering behövs om om vaccinet droppar från näsan, patienten snyter sig eller nyser.

Vanlig indikation

Nasalt influensavaccin för barn och ungdomar 2 - 18 år.

Vanlig dosering

0,1 mL i vardera näsborren (en näspipett innehåller 0,2 mL och samma näspipett används till båda näsborrarna).

Barn som inte tidigare fått influensavaccin ska ha en andra uppföljningsdos efter ett intervall på minst 4 veckor.

Substans

Influenza, vaccin levande försvagat, J07BB03

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2013-11-12

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-09-08 13:58:49

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-09-08 14:43:30

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3287

ID/spårnummer: 327

Giltig fr o m: 2014-09-08 14:43:30

Utskriftsdatum: 2014-09-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

