



Trientin oralt

(ex Cufence, Cuprior) kapslar/tablett

Cufence och Trientine Tillomed innehåller en annan saltform än Cuprior, därför doseras preparaten olika, se Dos och Indikation samt Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 200 mg (Cufence)
En kapsel innehåller 200 mg trientinbas motsvarande 300 mg trientinDIhydroklorid.

Kapslar 167 mg (Trientine Tillomed)
En kapsel innehåller 167 mg trientinbas motsvarande 250 mg trientinDIhydroklorid.

Tabletter 150 mg (Cuprior)
En tablett innehåller 150 mg trientinbas motsvarande 96 mg trientinTETRAhydroklorid.

ADMINISTRERING

Oralt: Ska administreras 1 tim före eller 2 tim efter normal måltid (t ex lunch) och intag av andra läkemedel för att tillåta maximalt upptag av läkemedlet.

Tabletter Cuprior har skåra och kan delas i två lika stora doser.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Cuprior (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

Cufence (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt

Trientine Tillomed (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnhepatolog.

Wilson's sjukdom

Barn:
Cufence/Trientine Tillomed
Dos i trientinbas: 6,5 mg/kg x 2 alt 4,3 mg/kg x 3
Dosen avrundas till närmast 167 alt 200 mg kapsel.

Cuprior
Dos i trientinbas: 4,2 mg/kg x 2 alt 2,8 mg/kg x 3
Dosen avrundas till närmast 75 mg (halv tablett) eller 150 mg (en tablett).

ÖVRIG INFORMATION

Samtidigt behandling med järn bör undvikas, risk för toxisk komplexbindning.

Behandlingseffekten bör monitoreras regelbundet genom serum och urinprover.

Wilson's sjukdom kombinationsbehandlas dietärt och farmakologiskt. Dietärt är målet att minska kopparbelastningen via föda. Patienten bör undvika intag av kopparrika livsmedel inklusive lever, mörk choklad, skaldjur, svamp och nötter trots att evidens för strikt dietbehandling är låg.

Kopparkärl ska ej användas till matlagning. Borråd brunn och vissa lågprisvattenkokare kan vara andra källor till koppar.

Cufence, Trientine Tillomed och Cuprior finns registrerade i Sverige, styrkan på dessa preparat är angiven i trientinbas. Internationellt finns andra trientinpreparat där styrkan är angiven i saltformen (trientinDIhydroklorid eller trientinTETRAhydroklorid). Detta måste beaktas när man doserar patienten.

Cuprior (trientinTETRAhydroklorid) är inte direkt utbytbar mot Cufence eller Trientine Tillomed kapslar pga skillnad i farmakokinetik.





Trientin oralt

(ex Cufence, Cuprior) kapslar/tablett

REFERENS/LÄNK

Artikel Concern as cost of liver disorder drug increases by 600%

<http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3716578/Concern-cost-liver-disorder-drug-increases-600.html>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Henriet T. et al. Solid state stability and solubility of triethylenetetramine dihydrochloride. 2016

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27377012>

PubMed PMID Peter Ferenci et al. EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson's disease. European Association for Study of Liver.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340672>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Trientine

http://www.trientine.com/sites/www.trientine.com/uploads/files/Trientine_SPC_Jan_2014.pdf

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3289

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 3289

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-05-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT