

Soldactone IV inj, 100 mg/mL

Potassium canrenoate

En-stegsspädning:	Soldactone		Medföljande vätska		INJ
	200 mg	+		=	100 mg/mL
	1 st		1 st		2 mL

Beredningsinstruktion

Torrampullen blandas med medföljande vätska.

Administrerings sätt

Intravenös injektion: Injektion under minst 3 min.

Vanlig indikation och dosÖdem vid hjärtsvikt
Ascites

Neo: 1 - 2 mg/kg x 2

Barn från 1 mån: 1 - 2 mg/kg, max 200 mg, x 2. Maxdos 400 mg/ dygn.

Övrig information

Soldactone innehåller kaliumkanrenoat, en vattenlöslig metabolit till spironolakton.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2015-01-20

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

PubMed PMID Population pharmacokinetic model of canrenone after intravenous administration of potassium canrenoate to paediatric patients., Hämtat: 2015-01-21

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3495151>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-01-20

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-20 13:57:38

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-20 11:13:35

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3290

ID/spårnummer: 647

Giltig fr o m: 2015-04-20 13:57:38

Utskriftsdatum: 2015-04-20

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

