



Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL

(Soldactone licens) barn över 10 kg

EN-STEGSSPÄDNING

Soldactone		Medföljande vätska		INJ LÖ
200 mg				100 mg/mL
1 st	+	2 mL	=	2 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion:
Ges långsamt för att undvika lokal smärta på injektionsstället.

RIMLIG DOS för Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	-	-	0,1 mL	0,5 mL
2 mg/kg	-	-	0,2 mL	1 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Soldactone (licensprodukt)

200 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
HÅLLBAR: Förvaras i högst 30 °C. Skyddas mot ljus.
100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning
HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna spädning lämpar sig för volymer till barn över 10 kg. För barn under 10 kg, se annan instruktion.

Ödem vid hjärtsvikt

Ascites

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Behov av kaliumsparande diuretikum

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 (- 2,5) mg/kg x 2 (- 3)

ÖVRIG INFORMATION

Kaliumkanrenoat är en vattenlöslig metabolit av spironolakton.

För att konvertera till motsvarande oral dos spironolakton ska dosen kaliumkanrenoat multipliceras med 0,7.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

PubMed PMID Population pharmacokinetic model of canrenone after intravenous administration of potassium canrenoate to paediatric patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22376078>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Soldactone

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3290

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-11

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-11

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3290

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2019-09-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT