

Diazepam (ex Stesolid, Diazepam Desitin) PO, PR

Diazepam

OBS! Flera styrkor och beredningsformer finns

Hållbarhet preparat:

Diazepam Desitin (Registrerad Produkt)

 5 mg, Rektallösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. 10 mg, Rektallösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25°C.

Stesolid (Registrerad Produkt)

 5 mg, Suppositorium, Hållbar: Förvaras vid högst 25°C.

Administreringsätt

Oralt: Anslagstiden vid oral administrering är 15 - 30 minuter och durationen är 1 - 3 timmar.

Rektalt: Vid administrering av rektallösning ska barnet ligga framstupa eller på sidan.

Anslagstiden vid rektal administrering är 5 - 15 minuter och durationen är 1 - 3 timmar.

Vanlig indikation och dos

Sedering vid procedursmärta (rektalt eller oralt)

0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg

Epileptiska anfall (rektalt)

0,5 - 0,75 mg/kg, max 20 mg/dos

Feberkramp (rektallösning/klyksma)

0,5 - 0,75 mg/kg, max 20 mg/dos

Feberkramp i hemmet (rektallösning/klyksma):

0,5 mg/kg om anfall varar mer än 3 minuter.

Övrig information

Vid behandling av kramp kan dos upprepas efter 10 min om avsedd effekt inte

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-29 13:10:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-09-29 09:38:34

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3294

ID/spårnummer: 874

Giltig fr o m: 2015-09-29 13:10:20

Utskriftsdatum: 2015-09-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Diazepam (ex Stesolid, Diazepam Desitin) PO, PR

Diazepam

OBS! Flera styrkor och beredningsformer finns

uppnåts.

Detta blad gäller för diazepam innehållande preparat; Diazepam Desitin rektallösning (5 resp. 10 mg), Stesolid suppositorium (5 resp. 10 mg), rektallösning (5 resp 10 mg) samt tabletter (2, 5 resp. 10 mg)

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2014-11-07

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

FASS Diazepam Desitin rektallösning, Hämtat: 2014-11-03

<http://www.fass.se/LIF/product?3&userType=2&nplid=19960927000126&docType=3>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Behandling epileptiska anfall, Hämtat: 2014-11-03

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/e7aab014d8f2cf5cc1257a56002a2dac>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Feberkramper, Hämtat: 2014-11-03

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID3300C42FD7CC32ACC1257A55004498FC>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2014-11-07

http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2014-11-07

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-29 13:10:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-09-29 09:38:34

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3294

ID/spårnummer: 874

Giltig fr o m: 2015-09-29 13:10:20

Utskriftsdatum: 2015-09-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

