



Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL

(Biklin, Extempore)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Extemporeberedd amikacin 5 mg/mL

Alt. 2 - 3: Spädning från Biklin 250 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| Biklin 250 mg/mL 1 mL | + | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 49 mL | = | INJ-INF LÖ 5 mg/mL 50 mL |
|-----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 3

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| Biklin 250 mg/mL 2 mL | + | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 100 mL | = | INJ-INF LÖ 5 mg/mL 102 mL |
|-----------------------------|---|---|---|--|

Beredningsinstruktion:

Infusionspåsar/flaskor i plast är överfulla. Överfyllnadsvolymen skiljer sig mellan olika tillverkare och förpackningar. Koncentrationen amikacin i en 100 mL påse blir med denna spädning därför ca 4,4 - 4,9 mg/mL (alt. 3).

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion:

Ges i första hand som infusion under 30 - 60 min.

Intravenös injektion (3 - 5 min):

Alternativ om infusion inte är möjlig.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid asfyxi och njursvikt.

Viktigt att följa serumkoncentrationen (dalvärde) och njurfunktion pga oto- och/eller nefrotocitet, se Övrig information. Max kumulativ dos per kur 15 g.

För att undvika överdosering bör amikacin doseras utifrån vikt för medel-BMI för barnets ålder och längd.

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för amikacin

Nyfödda:

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 18 mg/kg var 36:e - 48:e timme

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 18 mg/kg var 36:e timme

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 18 mg/kg var 36:e timme

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 18 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Bakteriell meningit

Barn 1 mån - 18 år: 7 - 10 mg/kg x 3, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar





Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL

(Biklin, Extempore)

RIMLIG DOS för Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 7,5 mg/kg | - | 7,5 mL | 15 mL | 75 mL |
| 10 mg/kg | - | 10 mL | 20 mL | 100 mL |
| 15 mg/kg | - | 15 mL | 30 mL | 150 mL |
| 18 mg/kg | 3,6 mL | 18 mL | 36 mL | 180 mL |

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amikacin APL (extempore - ej lagervara)

5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad: flaska 28 dagar i kylskåp, spruta 8 dagar i kylskåp. Efter första uttag i injektionsflaska: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

Biklin (från registrerad produkt)

250 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Bör ej sparas efter första uttag pga förväxlingsrisk. Alternativt ska inte färdigspädd lösning sparas. Efter första uttag: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endokardit eller behandling av immunosupprimerade patienter

Dygnsdosen bör delas upp på 2 doseringstillfällen då det inte finns tillräckligt stöd för dosering 1 gång dagligen i dessa fall.

Barn 1 mån - 18 år: 7,5 mg/kg x 2, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Viktigt att följa serumkoncentration (dalvärde) och njurfunktion under pågående behandling. Dalvärde (0-prov) tas vanligen upp till 30 min innan nästa dos, oftast under andra behandlingsdygnet samt därefter 2 - 3 gånger per vecka.

Mål för dalvärde:

2 - 5 mg/L för att minska risken för oto- och/eller nefrotoxicitet.

Dalvärdet indikerar om dosintervallet är adekvat gällande biverkningsrisk men kan även ge information om kortare tidsintervall skulle vara möjligt (vid terapivikt).

Vid t.ex. låg dos eller tveksam behandlingseffekt kan även kontroll av toppkoncentrationen vara av värde. Prov tas 30 min efter avslutad infusion.

Mål för toppvärde:

Mellan 32 - 64 mg/L beroende på känt MIC-värde



Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Biklin, Extempore)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-04-02

ePedID: 3295

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT