

# Fentanyl, NASALT 50 mikrog/mL

Fentanyl

En förutsättning för att använda Fentanyl är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera opioidöverdosering och ha tillgång till ventilationsutrustning.

---

## Hållbarhet preparat:

Fentanyl (Registrerad Produkt)

- 50 mikrog/mL, Injektionsvätska, för nasalt bruk, Hållbar: 24 tim kyl, 12 tim rumstemp

---

## Administreringsätt

Nasalt: Administreras outspätt nasalt 20-25 minuter innan behandlingstillfälle. Nasal tillförsel ges med fördel som spray. För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Administrera 0,1 - 0,2 mL i taget så att doseringen blir rätt anpassad efter patientens vikt.

Anslagstid 10 minuter, tid till max effekt 20 - 30 minuter.

---

## Vanlig indikation och dos

Procedursmärta

Barn över 1 månad: 0,5 - 1,5 mikrog/kg

---

## Övrig information

Ny dos bör inte ges förrän efter 50 - 60 minuter.

## Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2014-11-12

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show-grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade)

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 11:15:28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 11:15:24

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3297

ID/spårnummer: 619

Giltig fr o m: 2015-03-31 11:15:28

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

