

Naloxon NASALT 0,4 mg/mL (400 mikrog/mL)

naloxone

Administreringsätt

Nasalt: OBS! I första hand ges naloxon intravenöst eller intramuskulärt. Om detta inte fungerar kan nasal tillförel användas.

Administreras utspätt nasalt. Nasal tillförel ges med fördel som spray. För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Vanlig indikation och dos

Opioidinducerad andningsdepression

10 - 20 mikrog/kg (0,01 - 0,02 mg/kg)

Övrig information

Antidot vid överdos med opioider om infart saknas.

Referens/Länk

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2014-12-15

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2014-12-15

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Karolinska Sjukhuset Smärtkompendiet, Hämtat: 2014-11-20

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf//25DCB05F963DC1ECC1257A87002549BD/\\$File/AMIK95WG2R.pdf?OpenElement](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf//25DCB05F963DC1ECC1257A87002549BD/$File/AMIK95WG2R.pdf?OpenElement)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:36:03

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:36:00

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3307

ID/spårnummer: 589

Giltig fr o m: 2015-03-24 13:36:03

Utskriftsdatum: 2015-03-24

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

