

Berirab (licens, Humant rabiesimmunoglobulin, HRIG), IM inj 150 E/mL

Rabies immunoglobulin

Ordinerad dos kan spädas om det finns multipla sår att infiltrera.

Administreringsätt

Intramuskulär injektion: Så mycket som möjligt ska ges i och runt såren (ävenom såren är läkta) och resten intramuskulärt i annan kroppsdel än rabiesvaccinet.

Om inget sår kan ses men anamnes passar på transdermalt bett ges hela dosen intramuskulärt.

Vanlig indikation och dos

Post exponering för rabiessmitta

Barn: 20 E/kg

Övrig information

HRIG ges alltid till patient med nedsatt immunförsvar (följ upp antikroppssvar) och HRIG ges omedelbart till patienter som tillhör riskkategori 3 enligt WHO.

Vid osäkerhet om patienten tillhör riskkategori 2 eller 3 ges HRIG.
Om HRIG redan givits på annan plats, ge HRIG enbart runt såret.

Ge inte HRIG om mer än 7 dagar gått sedan vaccination påbörjats eller om fullgod preexponeringsprofylax med 3 doser vaccin givits.

Undvik om möjligt immunnedsättande läkemedel.

Referens/Länk

Internetadress WHO Guide for post-exposure prophylaxis, Hämtat: 2015-01-16

<http://www.who.int/rabies/human/postexp/en/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Rabies - postexpositionsprofylax, Hämtat: 2015-01-16

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDFE4E64843C81DD9C1257A3100434FD2?OpenDocument>

Rekommendation (Grade 1C), Hämtat: 2015-01-20

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-01-16 11:53:52

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-01-20 11:37:51

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3310

ID/spårnummer: 507

Giltig fr o m: 2015-01-20 11:37:51

Utskriftsdatum: 2015-01-20

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

