

Varitect CP 25 E/mL infusion

Varicella/zoster immunoglobulin

Överkänlighetsreaktion kan förekomma.
Följ administreringsrekommendationerna för att minska risken.

Hållbarhet preparat:

Varitect CP (Licensprodukt)

● 25 E/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: Får ej sparas, används direkt

Administreringsätt

Intravenös infusion: Initialt 0,1 mL/kg/tim i 10 minuter. Om det tolereras kan det gradvis och långsamt ökas till 1 mL/kg/tim tills hela dosen är given.

Vanlig indikation och dos

Behandling och profylax vid varicella zoster smitta eller exponering.

Postexpositionsprofylax: 25 E/kg (vid tätare exponering, ex samma hushåll, kan högre doser vara aktuella). Postexpositionsprofylax ges inte senare än 96 tim efter exponering.

Behandling av varicella zoster infektion: 25 - 50 E/kg med upprepade doser beroende på klinisk bild.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
25 E/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL

Övrig information

- Överkänlighetsreaktion kan förekomma. Följ administreringsrekommendationerna för att minska risken. Patienter ska övervakas under och minst 20 minuter efter infusionen.
- Se till att patienten är väl hydrerad.
- Ursprung ur blodprodukt. Dokumentera batchnummer vid administrering.

Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-01-21

http://www.essential-evidence-plus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Varitect CP, Hämtat: 2015-01-21

<http://www.fhi.no/dokumenter/eb1262fa1c.pdf>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2015-01-21 10:21:49

Fastställare/läkare: Lars Naver 2015-01-21 14:03:18

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3311

ID/spårnummer: 513

Giltig fr o m: 2015-01-21 14:03:18

Utskriftsdatum: 2015-04-01

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

