



Vaccin: RotaTeq oralt

mot rotavirus, oral lösning

Kontraindicerat vid tidigare invagination, allvarlig immunbrist eller överkänslighet mot sackaros.

Ökad risk för apnéer hos barn födda före graviditetsvecka 29. Beakta behov av andningsövervakning under 48 - 72 tim efter vaccinationen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levande försvagat vaccin i endosbehållare, ska ej spädas

1 dos = 2 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Endosbehållaren kan tas ut ur kylskåpet 15 min innan administreringen. Tryck ut vätskan från endosbehållaren direkt i barnets mun mot kindens insida. Upprepade tryck på behållaren kan behövas för att få ut allt vaccin.

Om barnet spottar ut eller kräks upp större delen av dosen kan EN ny dos ges vid samma dostillfälle.

Lösningen ska vara blekgul och klar, men kan ha en rosa nyans.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

RotaTeq (registrerad produkt)

2 mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Används direkt när endosbehållaren har öppnats.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sedan 1 sep 2019 ingår vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Första dosen ska ges före 12 veckors ålder, annars ska barnet inte alls vaccineras mot rotavirus.

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet, barn födda från gestationsvecka 25

Dos: 2 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 6 v ålder (senast före 12 v ålder)

Dos 2: vid 3 mån ålder (minst 4 v efter dos 1, senast före 16 v ålder)

Dos 3: vid 5 mån ålder (minst 4 v efter dos 2, senast före 22 v ålder)

De strikta åldersangivelserna ovan anges i vaccinationsprogrammet för att i möjligaste mån minimera risken för tarminvagination. Enligt godkänd produktresumé kan dock sista dosen, vid behov, ges senast vid 32 veckors ålder.

ÖVRIG INFORMATION

Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer angående övergång mellan olika vacciner (se referens):

I första hand bör varje barn få hela vaccinationsserien med ett och samma vaccin, men en blandad vaccinationsserie medför ingen risk för barnet. Maximalt 3 doser vaccin ska ges i en blandad serie:

- Om en dos RotaTeq ges efter en dos Rotarix bör ytterligare en dos RotaTeq ges efter 4 veckor.
- Om en dos Rotarix ges efter en dos RotaTeq bör ytterligare en dos Rotarix ges efter 4 veckor.
- Om en dos Rotarix ges efter två doser RotaTeq är vaccinationsserien klar.





Vaccin: RotaTeq oralt

mot rotavirus, oral lösning

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccin mot rotavirus

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination av för tidigt födda barn

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/vaccination-av-prematura-barn/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer angående övergång mellan olika vacciner i samband med nationell vaccinupphandling 2018 och 2019

<https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligt-nationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationella-arbetsgrupp-for-vaccin....pdf>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3312

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-08

ePedID: 3312

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-16

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT