

Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL

(Dexdor)

Administreringsätt

Nasalt: Administrera HÄLFTEN av den totala dosen i vardera näsborre. Volymen per näsborre ska inte överstiga 0,2 mL.
För större barn: Om den halverade totala dosen innebär att volymen blir större än 0,2 mL per näsborre så upprepas sprayning med 30 sekunders intervall.

För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Vanlig indikation och dos

Premedicinering inför procedur, ex. anläggning av PVK.

1 - 2 mikrog/kg nasalt. Kan upprepas efter 30 minuter vid behov.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mikrog/kg			0,1 mL	0,5 mL
2 mikrog/kg		0,1 mL	0,2 mL	1 mL

Hållbarhet preparat:

Dexdor (Registrerad Produkt)

- 100 mikrog/mL, Nässpray, lösning

Hållbar: 10 dagar rumstemperatur om märkt: "ENDAST FÖR NASALT BRUK".

Se vidare under rubriken "Övrigt".

Övrig information

Vid användning av injektionsflaskor för nasalt bruk med lång hållbarhet (10 dagar) är det mycket viktigt att god aseptik används vid dosuttag.

Flaskan måste vara tydligt märkt "ENDAST FÖR NASALT BRUK" med brytdatum ex. bruten 2015-01-14 hållbar till 2015-01-23. Detta gäller endast injektionsflaska med gummimembran 10 mL.

Om åtgången är mindre används brytampull på 2 mL där de doser som behövs för dagen dras upp och märks, därefter kasseras brytampullen.

Referens/Länk

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-10-06 10:28:23

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 13:29:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3317

ID/spårnummer: 1600

Giltig fr o m: 2016-10-11 13:29:39

Utskriftsdatum: 2016-10-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (Dexdor)

FASS , Hämtat: 2015-03-23

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Juen et al. A randomised comparison of two intranasal dexmedetomidine doses for premedication in children, Anaesthesia 67, 11, 1210-16., Hämtat: 2015-03-23

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2012.07309.x/full>

Internetadress Svensk läkemedelsstandard - Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel, Hämtat: 2015-03-24

<https://lakemedelsverket.se/sls>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sederling vid MR-undersökning av barn med dexmedetomidine, Hämtat: 2015-03-24

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID/E97D22A9BDC2F572C1257DAB004E948A>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-03-24

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Substansspecifika uppgifter

Dexmedetomidin, N05CM18

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-10-06 10:28:23

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 13:29:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3317

ID/spårnummer: 1600

Giltig fr o m: 2016-10-11 13:29:39

Utskriftsdatum: 2016-10-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

