



## Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL

(Kåvepenin) orala droppar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädda orala droppar 250 mg/mL (Kåvepenin)

Alt. 2 - 3: Granulat till orala droppar Kåvepenin 250 mg/mL, späds på vårdenhet

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt. 2 - 3 används.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 2 Granulat till slutvolym 20 mL

Kåvepenin 250 mg/mL		Sterilt Vatten		ORALA DR LÖS
1 flaska	+		=	<b>250 mg/mL</b>
1 st		17 mL		20 mL

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 3 Granulat till slutvolym 40 mL

Kåvepenin 250 mg/mL		Sterilt Vatten		ORALA DR LÖS
1 flaska	+		=	<b>250 mg/mL</b>
1 st		34 mL		40 mL

#### Beredningsinstruktion:

Granulatet bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Skakas väl innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Infektion hos nyfödda

Doseringsintervall beror på postnatal ålder:

0 - 7 dagar: 25 mg/kg x 2

8 - 21 dagar: 25 mg/kg x 3

22 - 28 dagar: 25 mg/kg x 4

Behandlingstid: minst 7 - 10 dagar

#### Akut otitis media (AOM)

Vid säker AOM hos barn 1 - 12 år: aktiv expektans

Vid säker AOM hos barn under 1 år eller över 12 år: antibiotikabehandling 25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 2 g x 3.

Behandlingstid: 5 dagar, vid recidiv inom 4 veckor: 10 dagar

#### Pneumoni

Barn 1 mån - 4 år:

20 - 25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 2 g x 3.

Behandlingstid: 5 - 7 dagar

Barn 5 - 18 år:

12,5 (- 25) mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 2 g x 3.

Behandlingstid: 7 dagar

#### Akut sinuit

Expektans rekommenderas vid symtom färre än 10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

Barn 1 mån - 18 år:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 2 g x 3.

Behandlingstid: 7 - 10 dagar





## Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL

(Kåvepenin) orala droppar

### RIMLIG DOS för Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
25 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
max 1 g	-	-	-	4 mL
max 1,6 g	-	-	-	6,4 mL
max 2 g	-	-	-	8 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kåvepenin 250 mg/mL (registrerad produkt)

1 flaska, Granulat till orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda flaskstorlekarna.

250 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Hållbar 20 dagar efter beredning.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Akut streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 12,5 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dagar

#### Infekterade kattbett eller som profylax vid djupt penetrerande bett

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dagar

#### Borrelia med solitärt erytema migrans

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dagar

#### Tandabscess

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 2 g x 3

Behandlingstid: 5 - 7 (- 10) dagar

#### Erysipelas (rosfeber)

Barn 1 mån - 18 år:

25 mg/kg x 3, max 1 g x 3. Kan vid behov ökas till max 2 g x 3.

Behandlingstid: 10 - 14 dagar

#### Intertriginös streptokockdermatit (ex stjärtfluss)

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 7 dagar

#### Penicillinprovokation

Engångdos 25 mg/kg i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.





## Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL

(Kåvepenin) orala droppar

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Infektionsprofylax efter splenektomi

Barn 1 mån - 18 år: 12,5 mg/kg x 2, max 1 g x 2

Behandlingstid:

Barn yngre än 5 år: till minst 5 års ålder

Barn från 5 år: minst 2 år

### ÖVRIG INFORMATION

Absorberas till ca 50 %, samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad.

Observera att det är stor variation i absorptionsgrad för prematurt nyfödda.

Vid kattbett ska första åtgärd alltid vara noggrann rengöring av såret genom ordentlig flushning med natriumklorid.

I funktionen Rimlighetskontrollen är doseringsgränserna för barn 1 mån - 18 år satta med hänsyn till doseringstabellen i FASS som har fast dosering för olika viktsintervall. Dosen per kg för de lägsta vikterna i intervallen blir där högre än högsta dosen per kg i denna instruktion (25 mg/kg).





## Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL

(Kåvepenin) orala droppar

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan2.janusinfo.se/20201/Infektioner/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

janusinfo.org Strama Stockholm

<http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Antibiotikaprofylax i tandvården

[www.lakemedelsverket.se/profylax-tandvard](http://www.lakemedelsverket.se/profylax-tandvard)

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av Borreliainfektion

<https://lv.se/borreliainfektion>

Neonatal Formulary

Rekommendation (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrik hematologi och onkologi - Vårdprogram Splenektomi

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-vardplaneringsgruppen-for-pediatrik-hematologi/vardprogram-vph/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk barninfektionsförening, Borreliainfektion hos barn

<https://inf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-06-05

ePedID: 3324

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-09

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-06-09

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**