



Nitrofurantoin oralt

(ex Furadantin) tabletter

Kontraindicerat till nyfödda.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5 mg respektive 50 mg.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Ska intas med mat för ökad absorption och för att minska risken för illamående.

Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i mat.

ÖVRIG INFORMATION

Får ej ges till nyfödda då nitrofurantoin kan inducera hemolytisk anemi om patientens röda blodkroppar har otillräckliga mängder reducerat glutation.

Nitrofurantoin ska inte heller ges till barn med GFR under 40 mL/min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nitrofurantoin (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Urinvägsinfektion utan njurengagemang

Barn 1 mån - 18 år: 1,5 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn över 2 år: 5 dagar

Urinvägsinfektion, profylaxbehandling

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1

Ges vanligen till kvällen/natten.

Antibiotikaprofylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 1 - 2 mg/kg

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Övriga preparat

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-preparat/>

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3328

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-10-02

ePedID: 3328

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-03

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT