



## Trimetoprim oralt

(Idotrim) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 100 och 160 mg (Idotrim)

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid dosering 3 mg/kg. För lägre doser och för yngre barn rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos.

Enteralt i sond: Använd oral suspension, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Trimetoprim (registrerad produkt)

100 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska doseras i hela tabletter. Vid behov av annan dosering rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

#### Urinvägsinfektion utan njurengagemang, efter odlingssvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år.

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 150 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn 2 - 18 år: 5 dagar

#### Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1

#### Profylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg

#### Kolangitprofylax efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Uppföljande peroral profylaxbehandling efter första och andra kolangiten samt vid upprepad kolangit mer än 3 mån efter föregående kolangit.

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Behandlingstid: 2 mån

### ÖVRIG INFORMATION

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk Förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.



## Trimetoprim oralt

(Idotrim) tabletter



### REFERENS/LÄNK

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, UVI - Urinvägsinfektion i öppenvård

<https://lv.se/uvi>

Rekommendation , (Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3329](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3329)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-02-19

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 3329

Versionsnummer, major: 7

Giltig fr o m: 2020-02-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**