



Trimetoprim oralt

(Idotrim) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 100 och 160 mg (Idotrim)

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid dosering 3 mg/kg. För lägre doser och för yngre barn rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos.

Enteralt i sond: Använd oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Trimetoprim (registrerad produkt)

100 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska doseras i hela tabletter. Vid behov av annan dosering rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Urinvägsinfektion utan njurengagemang, efter odlingssvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år, se Övrig information.

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 150 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn 2 - 18 år: 5 dagar

Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Nyfödda: för dosering se instruktion för oral suspension

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1

Profylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg

Kolangitprofylax efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Uppföljande peroral profylaxbehandling efter första och andra kolangiten samt vid upprepad kolangit mer än 3 mån efter föregående kolangit.

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn

Behandlingstid: 2 mån





Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Urinvägsinfektion hos barn under 2 år ska alltid betraktas och behandlas som pyelonefrit och för denna indikation är oftast trimetoprim inte tillräckligt eftersom effekten endast är bakteriostatisk.

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefrologisk förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, UVI - Urinvägsinfektion i öppenvård

<https://lv.se/uvi>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3329

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-28

ePedID: 3329

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-28

Versionsnummer, major: 7

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT