



Trimetoprim oralt

(Idotrim) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 100 mg och 160 mg (Idotrim)

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid dosering 3 mg/kg. För lägre doser och för yngre barn rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge halv dos.

Enteralt: Använd oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Trimetoprim (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska doseras i hela tabletter. Vid behov av annan dosering rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Urinvägsinfektion utan feber och utan njurengagemang, efter odlingssvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år, se Övrig information.

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 200 mg x 2

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 160 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn 2 - 18 år: 5 dagar

Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg x 1

Alternativt fast dosering:

Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1

Profylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg

Kolangit efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Ges efter inledande intravenös behandling.

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg x 1

Behandlingstid: 2 mån





Trimetoprim oralt

(Idotrim) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling av lindrig - måttlig *Pneumocystis jirovecii*-pneumoni (PJP)

Endast till patienter som inte kan behandlas med trimetoprim/sulfametoxazol.
Ges i kombination med dapson, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3

Behandlingstid: vanligen 21 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Urinvägsinfektion hos barn under 2 år ska alltid betraktas och behandlas som pyelonefrit och för denna indikation är oftast trimetoprim inte tillräckligt eftersom effekten endast är bakteriostatisk.

Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a. BLF/Svensk Barnnefroligisk förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i andra källor t.ex. FASS och BNF-C.





Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompodium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompodium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

www.lakemedelsverket.se/uvi

PubMed PMID Pyrgos V et al. Pneumocystis pneumonia in children, 2009.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879509>

PubMed PMID Siberry G K et al. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-exposed and HIV-infected children: recommendations from the National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, the HIV Medicine Assoc

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24569199>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrolgisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3329

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3329

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 9

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-02-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT