

Cedax PO, kapsel 400 mg

Ceftibuten

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner

Administreringsätt
Oralt

Vanlig indikation och dos

Urinvägsinfektion

Barn över 45 kg: 1 tabl x 1

Profylax vid MUC (andrahandsval)

Engångsdos 9 mg/kg, dvs 1 tablett för barn över 45 kg.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Urinvägsinfektion hos barn,
Hämtat: 2015-05-06

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vvWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/\\$File/CEKG9FL8KV.pdf](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vvWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/$File/CEKG9FL8KV.pdf)

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-05-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Antibiotikaprofylax vid MUC,
Hämtat: 2015-04-29

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/5986145EDF3A47C7C1257DCD004E3B7C>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-29 13:44:05

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-06 15:41:46

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3330

ID/spårnummer: 686

Giltig fr o m: 2015-05-06 15:41:46

Utskriftsdatum: 2015-05-06

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

