

Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (Spektramox), suspension

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos**Doserna nedan avser mängden amoxicillin****Infektion**

Barn under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 70 mg/kg/dygn
Barn över 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

Luftvägsinfektion vid CF

13 mg/kg x 3 (motsvarande 40 mg/kg per dygn)

Urinvägsinfektion (efter odlingssvar)

Barn under 40 kg: 25 mg/kg x 3

Skelettinfektion (tredjehandsalternativ vid uppföljande peroral behandling)

17 mg/kg x 3 (motsvarande 50 mg/kg per dygn)

Hundbett, kattbett

Barn under 25 kg: 20 mg/kg x 3, maxdos 1500 mg/dygn
Barn över 25 kg: 500 mg x 3

Behandlingstid 10 dygn

Etmoidit (lätta till måttliga symtom, men bakteriell misstanke)

20 mg/kg x 3

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-07-08 09:00:41
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-19 14:44:52
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3331
ID/spårnummer: 1412
Giltig fr o m: 2016-08-19 14:44:52
Utskriftsdatum: 2016-08-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (Spektramox), suspension

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mg/kg/dos	0,25 mL	1,2 mL	2,5 mL	12,5 mL

Hållbarhet preparat:

Amoxicillin+klavulansyra (ex Spektramox) (Registrerad Produkt)

 80 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Färdigberedd oral suspension förvaras i kylskåp och är hållbar 7 dygn.

Övrig information

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna suspension. Detta förhållande lämpar sig bättre för dosering två gånger dagligen och för äldre barn och i de fall man önskar administrera mindre volym. Därmed erhålls inte för låg dos klavulansyra.

Det finns även en oral suspension med styrkan 50 + 12,5 mg/mL (förhållande 4:1). Den lämpar sig bättre för mindre barn och för dosering tre gånger dagligen

Enligt Fass saknas klinisk data för formuleringar av Spektramox 7:1 för patienter under 2 månader.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-07-08

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-07-08

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2016-07-08

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-05-25

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Etmoidit, Hämtat: 2015-05-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID1F6F5E13103DE495C1257A2900419A33>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-02-25

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Skelettinfectioner hos barn, Hämtat: 2015-05-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID0E96D8E8EA7D6048C1257C3E003538B8>**Substansspecifika uppgifter**

Amoxicillin and enzyme inhibitor, J01CR02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POESUJAGPUVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-07-08 09:00:41

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-19 14:44:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3331

ID/spårnummer: 1412

Giltig fr o m: 2016-08-19 14:44:52

Utskriftsdatum: 2016-08-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

