

Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (Spektramox) oral suspension

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta styr doseringen.
Denna instruktion lämpar sig för barn över 2 månader när man önskar dosera två gånger dagligen.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringssätt
Oralt

Vanlig indikation och dos

Doserna nedan avser mängden amoxicillin.

Infektion

Barn över 2 mån och under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 70 mg/kg/dygn

Barn över 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|------|---------|---------|---------|
| 12,5 mg/kg | | 0,78 mL | 1,56 mL | 7,81 mL |

Hållbarhet preparat:

Amoxicillin+klavulansyra (ex Spektramox) (registrerad produkt)

● 80 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Färdigberedd oral suspension förvaras i kylskåp och är hållbar 7 dygn.

Övrig information

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna suspension. Detta förhållande lämpar sig bättre för dosering två gånger dagligen och för barn över 2 månader när man önskar administrera mindre volym. Därmed erhålls inte för låg dos klavulansyra.

Det finns även en oral suspension med styrkan 50 + 12,5 mg/mL (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre för yngre barn och för dosering tre gånger dagligen.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-13 10:59:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 15:46:11

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3331

ID/spårnummer: 3357

Giltig fr o m: 2017-06-14 15:46:11

Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (Spektramox) oral suspension

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna suspension (7:1 förhållande). I dessa fall är 4:1 förhållande lämpligare, se annan instruktion.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Amoxicillin and enzyme inhibitor, J01CR02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POESUAGPUVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-13 10:59:55
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 15:46:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3331
ID/spårnummer: 3357
Giltig fr o m: 2017-06-14 15:46:11
Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

