



Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97/12 mg/mL

(ex Spektramox) oral suspension

Används inte vid misstanke om mononukleos pga risk för erytem.

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta styr doseringen.

Denna instruktion lämpar sig för barn över 2 månader när man önskar dosera två gånger dagligen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension amoxicillin + klavulansyra 80 + 11,97/12 mg/mL.

Observera att styrkeangivelsen för klavulansyra varierar mellan olika preparat.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond:

Kan vara svårt att administrera via sond pga hög viskositet. Spädning med vatten kan underlätta administrering. Suspensionen blandar sig med lika mängd vatten om den skakas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser mängden amoxicillin.

Infektion, t.ex akut otitis media, pneumoni och hud- och mjukdelsinfektioner

Barn över 2 mån och under 40 kg:
12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 35 mg/kg x 2

Barn över 40 kg: 875 mg x 2 (- 3)

Behandlingstid: vanligen 5 - 10 dagar

RIMLIG DOS FÖR 80 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	-	0,78 mL	1,56 mL	7,81 mL
22,5 mg/kg	-	1,41 mL	2,81 mL	-
max 875 mg	-	-	-	10,94 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-11-29

ePedID: 3331

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-11-29

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-11-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97/12 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension

ÖVRIG INFORMATION

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna suspension. Detta förhållande lämpar sig bättre för dosering två gånger dagligen och för barn över 2 månader när man önskar administrera mindre volym. Därmed erhålls inte för låg dos klavulansyra.

Det finns även en oral suspension med styrkan 50 + 12,5 mg/mL (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre för yngre barn och för dosering tre gånger dagligen. Se annan instruktion.

Amoxicillin + klavulansyra finns även som tableter med styrkorna 875/125 mg och 500 mg/125 mg, se andra instruktioner.

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna suspension (7:1 förhållande). I dessa fall är preparat med förhållandet 4:1 lämpligare, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amoxicillin+klavulansyra (registrerad produkt)

80 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Färdigberedd oral suspension förvaras i kylskåp och är hållbar 7 dygn.