

Fentanyl utvärtes depotplåster (ex Durogesic, Matrifen)

OBS! Använda plåster innehåller stor mängd läkemedel och måste hanteras korrekt. Vik ihop plåstret med häftmassan inåt och kassera som riskavfall (lämna in på apotek om användning i hemmet). Dödsfall har inträffat när barn fått tag på plåster och tuggat på dessa.

Administreringsätt

Utvärtes: Plåstret ska fästas på överkroppen eller överarmen på en obestrålad hudyta. För att minimera risken att barn tar bort plåstret kan det sättas på övre delen av ryggen. Huden ska vara helt torr innan plåstret appliceras.

I Fass-texten står att plåstren inte får delas men utifrån tillverkningsuppgifter gör vi bedömningen att Matrifen och Durogesic kan delas för att ge en mindre dos. Dosen är direkt korrelerad till plåstrets yta.

Efter att skyddsfilmen tagits bort ska plåstret fästas genom ett kraftigt tryck mot huden ca 30 sekunder. Ibland kan det behöva fästas med ytterligare tejp eller dylikt.

Undvik att röra plåstrets häftande yta och tvätta händerna efter applicering.

Vid byte av plåster ska en annan hudyta väljas för applicering. Samma ställe bör inte användas inom 7 dagar.

Vanlig indikation och dos

Långtidsbehandling av svår smärta till barn som får opioidbehandling

Doseringen av fentanyl baseras på tidigare opioidbehov.

Plåstret ska bytas var 48:e - 72:e timme (barn och ungdomar kan behöva byta i det tätare intervallet).

Övrig information

Den analgetiska effekten av den första dosen fentanylplåster kommer inte att vara optimal under de första 24 timmarna. Därför ska patienten stå kvar på sin tidigare dos analgetika under de första 12 timmarna efter bytet till plåster. Under de följande 12 timmarna kan tilläggsanalgetika behöva ges utifrån behov.

Plåstren ska förvaras i oöppnade kuvert tills användning.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-12 16:01:20
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-24 14:50:47
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3335
ID/spårnummer: 1109
Giltig fr o m: 2016-02-24 14:50:47
Utskriftsdatum: 2016-02-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fentanyl utvärtes depotplåster (ex Durogesic, Matrifen)

Vissa patienter reagerar på häftmassan i Matrifenplåstren. Byt till Durogesic i de fallen.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2015-05-29

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Personlig kontakt Stefan Lundeberg, ALB, Hämtat: 2015-09-16

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-09-16

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Fentanyl, N02AB03

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-02-12 16:01:20
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-02-24 14:50:47
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3335
ID/spårnummer: 1109
Giltig fr o m: 2016-02-24 14:50:47
Utskriftsdatum: 2016-02-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

