



Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Racekadotril granulat till oral suspension 10 och 30 mg (Hidrasec).

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Granulatet kan blandas i mat, vatten eller vätskeersättning. Blanda väl.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hidrasec (registrerad produkt)

10 mg, Granulat till oral suspension

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används omgående efter blandning med mat eller vätska. Gäller även 30 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré

Barn över 3 mån: 1,5 mg/kg x 3

Alternativt (fast dosering):

Barn över 3 mån och under 9 kg: 10 mg x 3

9 - 12 kg: 20 mg x 3

13 - 27 kg: 30 mg x 3

Över 27 kg: 60 mg x 3

Behandling bör fortsätta tills barnet fått två normala avföringar.

Behandlingstid max 7 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Innehåller sackaros.

Ges tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-09-02

ePedID: 3336

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT