

Amiodaron intravenös INF 1,5 mg/mL (ex Cordarone)

OBS! Olika styrkor finns, stor risk för förväxling. Kontrollera styrkan noggrant.

En-stegsspädning:	Amiodaron (ex. Cordarone)	Glukos 50 mg/mL	=	INJ-INF LÖ
	50 mg/mL +			1,5 mg/mL
	1,5 mL	48,5 mL		50 mL

Beredningsinstruktion: Får endast spädas med glukos 50 mg/mL.

Administreringsätt

Neo: Intravenös infusion 30 min i central infart.

Infusion i perifer ven kan orsaka smärta och inflammation.

Vanlig indikation och dos

Hjärtarytmi - IV administrering initialt vid behov av snabb effekt - ordineras i samråd med barnkardiolog

5 mg/kg, kan upprepas initialt om ej effekt, herefter 2,5 - 5 mg/kg x 1 -2.
Övergå till PO underhållsdosering snarast möjligt.

Ventrikelflimmer eller persisterande ventrikeltachykardi som inte svarar på defibrillering.

Barn: 5 mg/kg intravenöst. Max 300 mg

Allvarlig symtomgivande ventrikulär och supraventrikulär takyarytmi i samband med WPW, förmaksfladder/flimmer

Bolusdos: 5 mg/kg under 30 - 120 min

Därefter underhållsdos 7,5 - 15 mikrogram/kg/min under 12 - 24 timmar.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
15 mikrogram/kg/min			0,1 mL	0,5 mL
5 mg/kg	3,33 mL	16,7 mL	33,3 mL	167 mL

Hållbarhet preparat:

Amiodaron (ex. Cordarone) (Registrerad Produkt)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-09 08:54:37
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-09 10:13:58
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3347
ID/spårnummer: 1468
Giltig fr o m: 2016-09-09 10:13:58
Utskriftsdatum: 2016-09-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amiodaron intravenös INF 1,5 mg/mL (ex Cordarone)

- 50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning
Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag.
- 1,5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Hållbar: Ljuskänsligt. 12 tim rumstemperatur.

Övrig information

Ska ordineras i samråd med barnkardiolog.

Cordarone i koncentration över 2 mg/mL ska administreras i central infart.

Cordarone ska inte användas om arytmin orsakats av förgiftning, exempelvis med tricykliska antidepressiva.

Intravenösa beredningar med amiodarone innehåller bensylalkohol.

Referens/Länk

Akutpediatrikboken 2010 omslagets insida, Hämtat: 2015-08-25

FASS , Hämtat: 2015-08-25

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-08-25

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM Återupplivning, Hämtat: 2015-08-17

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDFF0D016740F9A478C1257A2A0040BDA0?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cordarone = Amiodarone 50 mg/ml (BIVAs ESR), Hämtat: 2015-08-20

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDEC44842F7D3E6A2DC1257B980031CE25?OpenDocument>

Substansspecifika uppgifter

Amiodarone hydrochloride, C01BD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POENUACWVFVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-09 08:54:37

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-09 10:13:58

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3347

ID/spårnummer: 1468

Giltig fr o m: 2016-09-09 10:13:58

Utskriftsdatum: 2016-09-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

