

Sabrilex PO, dospåse alt. Oral lösning 50 mg/mL

Vigabatrin

En-stegsspädning:	Sabrilex		Vatten (från kran)		ORAL SUSP
	500 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

Beredningsinstruktion

Lös upp dospåsens innehåll i 10 ml kallt eller rumstempererat vatten om delmängd önskas. Om pulvret löses upp i vatten har lösningen ett klart och gult utseende.

Hållbarhet preparat:

Sabrilex (Registrerad Produkt)

50 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Får ej sparas, används direkt

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Monoterapi vid infantil spasm när orsaken är tuberös scleros

Dag 1 - 4: 50 mg/kg

Dag 5 - 8: vb 100 mg/kg

Dag 9 - 14: vb 150 mg/kg

Dag 15: se PM "Behandling av infantila spasmer"

Dosen kan ges fördelat på 1 - 2 dostillfällen per dygn.

Maxdos: 150 mg/kg/dygn (75 mg/kg x 2)

Övriga symtomatiska infantila spasmer

Tilläggsbehandling fr o m dag 8:

Dag 8 - 11: 100 mg/kg/dag

Dag 12 - 21: 100 mg/kg/dag, max 150 mg/kg/dag

Dag 22: Vid spasmfrihet och förbättrat EEG: fortsatt Sabrilex i ca 3 månader i dos 75 - 150 mg/kg. Därefter nedtrappning på ca 2 mån. Vid recidiv under uttrappning tillfällig dosökning och förlänga kur.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-11 11:22:05

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-13 13:27:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3348

ID/spårnummer: 887

Giltig fr o m: 2015-10-13 13:27:50

Utskriftsdatum: 2015-10-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sabrilex PO, dospåse alt. Oral lösning 50 mg/mL

Vigabatrin

Tilläggsbehandling terapieresistent partiell epilepsi

Nyfödda - 12 år: Initialdos: 15 - 20 mg/kg x 2
dosen kan titreras upp var 3:e dag, under 2 - 3 veckor till 30 - 40mg/kg x 2

Barn 12 - 18 år: Initialdos: 250 mg x 2
dosen kan titreras upp var 3:e dag, under 2 - 3 veckor till 1 - 1,5 g x 2

Maxdos: 150 mg/kg/dygn, alt 3 g/dygn

Övrig information

Sabrilex bör ordineras av läkare med kännedom om detta preparat eller efter kontakt med sådan läkare.

Synfältsdefekter har rapporterats hos ca 1/3 av patienter som fått Vigabatrin. Därför måste en noggrann värdering av risk/nytta göras för varje patient.

Sabrilex kan tas före eller efter mat.

Om hela dospåsar ska administreras kan dospulvret läggas i en dryck (vatten, juice eller mjölk) direkt före intag.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2015-09-14

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

FASS , Hämtat: 2015-09-14

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substanceid=>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2015-09-14

http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-09-14

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-11 11:22:05

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-13 13:27:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3348

ID/spårnummer: 887

Giltig fr o m: 2015-10-13 13:27:50

Utskriftsdatum: 2015-10-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

