

## Chirocaine inf vätska 0,625 mg/mL med klonidin 1 mikrog/mL

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

### Tillsatser som ger Chirocaine inf vätska 0,625 mg/mL med klonidin 1 mikrog/mL

Chirocaine 0,625 mg/mL IV	100 mL
Catapresan 150 mikrog/mL IV	0,66 mL

### Administreringsätt

Perifer nervblockad  
Kontinuerlig infusion i EDA

### Vanlig indikation och dos

Postoperativ smärtlindring kontinuerlig sårinfiltration, perifer nervblockad, EDA

Prematura och fullgångna nyfödda: (0,15) - 0,2 - 0,25 mg/kg/timme

Från 1 mån ålder: 0,3 - 0,5 mg/kg/timme

Doser avser Chirocaine.

Vid dos 0,25 mg/kg/timme av Chirocaine får patienten 9,6 mikrogram/kg/dygn av klonidin.

### Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg/tim	0,32 mL/tim	1,6 mL/tim	3,2 mL/tim	16 mL/tim
0,3 mg/kg/tim	0,48 mL/tim	2,4 mL/tim	4,8 mL/tim	24 mL/tim
0,5 mg/kg/tim	0,8 mL/tim	4 mL/tim	8 mL/tim	40 mL/tim

### Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-09-15

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-09-16

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-22 13:39:42

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-09-22 13:39:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3349

ID/spårnummer: 864

Giltig fr o m: 2015-09-22 13:39:42

Utskriftsdatum: 2015-09-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

