

Chirocaine inf vätska 1,25 mg/mL med klonidin 1 mikrog/mL

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Tillsatser som ger Chirocaine inf vätska 1,25 mg/mL med klonidin 1 mikrog/mL

Chirocaine 1,25 mg/mL IV	100 mL
Catapresan 150 mikrog/mL IV	0,66 mL

Administreringsätt

Perifer nervblockad
Kontinuerlig infusion i EDA

Vanlig indikation och dos

Postoperativ smärtlindring kontinuerlig sårinfiltration, perifer nervblockad, EDA

Prematura och fullgångna nyfödda: (0,15) - 0,2 - 0,25 mg/kg/timme

Från 1 mån ålder: 0,3 - 0,5 mg/kg/timme

Doser avser Chirocaine.

Vid dos 0,25 mg/kg/timme av Chirocaine får patienten 4,8 mikrogram/kg/dygn av klonidin.

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg/tim	0,16 mL/tim	0,8 mL/tim	1,6 mL/tim	8 mL/tim
0,3 mg/kg/tim	0,24 mL/tim	1,2 mL/tim	2,4 mL/tim	12 mL/tim
0,5 mg/kg/tim	0,4 mL/tim	2 mL/tim	4 mL/tim	20 mL/tim

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-09-15

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-09-16

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-09-22 13:47:11

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-09-22 13:47:16

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3350

ID/spårnummer: 866

Giltig fr o m: 2015-09-22 13:47:16

Utskriftsdatum: 2015-09-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

