



Aprepitant oralt

(ex Emend) kapslar

Aprepitant interagerar med många läkemedel, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 80 och 125 mg (ex Emend)

ADMINISTRERING

Ges 1 timme innan start av cytostatikabehandling dag 1, resterande doser ges på morgonen.

Oralt: Kapseln ska sväljas hel. Delmängd ska inte ges pga dålig dosnoggrannhet. Vid behov av lägre doser bör aprepitant oral suspension användas, se annan instruktion. För att underlätta administrering vid sväljsvårigheter kan kapselns innehåll slamas upp i vatten och intas omgående.

Enteralt: Använd oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aprepitant (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, fuktkänsligt. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Aprepitant interagerar med många läkemedel, dosjustering kan därför behövas, se Övrig information.

Kapslarna ska sväljas hela. Vid sväljsvårigheter och andra doser än 80 respektive 125 mg rekommenderas den orala suspensionen.

Illamående, vid måttlig till högemetogen cytostatikabehandling

Barn 6 mån - 18 år:

Vikt	Dag 1	Dag 2 - 3
Över 6 kg - 8 kg	25 mg	15 mg
Över 8 kg - 10 kg	30 mg	20 mg
Över 10 kg - 12 kg	35 mg	25 mg
Över 12 kg - 15 kg	45 mg	30 mg
Över 15 kg - 20 kg	60 mg	40 mg
Över 20 kg - 25 kg	75 mg	50 mg
Över 25 kg - 30 kg	90 mg	60 mg
Över 30 kg	125 mg	80 mg

Vid högemetogena kurser som sträcker sig längre än 3 dagar kan förlängd behandling av aprepitant (upp mot 5 dagar) övervägas.





Aprepitant oralt

(ex Emend) kapslar

ÖVRIG INFORMATION

Behandling av cytostatikainducerat illamående kräver oftast kombination av flera antiemetika.

Vid samtidig behandling med dexametason, metylprednisolon eller betametason bör den vanliga perorala dosen av dessa kortikosteroider minskas med 50 %.

Vid samtidig behandling med posaconazol och flukonazol ska dosen aprepitant reduceras med 50 %.

Det finns en teoretisk risk för ökad exponering av ifosfamid vid samtidigt intag av aprepitant, vilket skulle kunna öka risken för encefalopati. Reducera därför dosen aprepitant med 50 % vid samtidig behandling med ifosfamid.

Aprepitant påverkar enzymerna CYP3A4 och CYP2C9. Metabolismen av andra läkemedel kan påverkas (t ex warfarin, ciklosporin, klaritromycin, etoposid, vinkristin, p-piller). Överväg därför dosmonitorering, särskilt för läkemedel med smalt terapeutiskt fönster.

Effekten av p-piller kan minskas (upp till 50 %) vid samtidig behandling med aprepitant.





Aprepitant oralt

(ex Emend) kapslar

REFERENS/LÄNK

Artikel Evaluation of aprepitant and fosaprepitant in pediatric patients
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30615239/>

FASS
<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>
Micromedex

PubMed PMID Aprepitant and fosaprepitant drug interactions: a systematic review
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28470980>

PubMed PMID Choi MR et al. Aprepitant Use in Children, Adolescents, and Young Adults for the Control of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting (CINV)
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736848>

PubMed PMID Duggin et al: Aprepitant reduces chemotherapy-induced vomiting in children and young adults with brain tumors
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972782>

PubMed PMID Dushenkov A et al. Drug interactions with aprepitant or fosaprepitant: Review of literature and implications for clinical practice.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921085>

PubMed PMID Shillingburg A. and Biondo L. Aprepitant and Fosaprepitant Use in Children and Adolescents at an Academic Medical Center
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25024673>

Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Aprepitant (Emend) 125 mg powder for oral suspension, EMA
<http://www.ema.europa.eu/ema>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)
<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardprogram-pho/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunit.org/eped_extra/lokalreferens.html#3351





Aprepitant oralt

(ex Emend) kapslar

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3351
Versionsnummer, major: 7
Giltig fr o m: 2022-06-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT