

Klonidin oralt 20 mikrog/mL

(Extempore)

Observera att det finns flera olika styrkor av oralt klonidin. Detta blad gäller oralt klonidin 20 mikrog/mL.

Administreringsätt

Oralt: Premedicineringsdos ges 40 - 60 minuter före planerad procedur.
Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 minuter.
Enteralt i sond: Går att ge i sond.

Vanlig indikation och dos

Nyfödda: Smärta

1 - 3 (- 4) mikrog/kg/dos x 3
(motsvarar 3 - 12 mikrog/kg/dygn)

Barn: Smärta, oro, opiatabstinens

1 - 3 mikrogram/kg/dos x 3

Premedicinering inför procedur (alla åldrar)

2 mikrogram/kg, max 150 mikrogram/dos

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mikrog/kg/dos	0,05 mL/dos	0,2 mL/dos	0,5 mL/dos	2,5 mL/dos
3 mikrog/kg/dos	0,15 mL/dos	0,8 mL/dos	1,5 mL/dos	7,5 mL/dos

Hållbarhet preparat:

Klonidin APL (Extempore - Lagervara)

20 mikrog/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Klonidin kan vara kontraindicerad hos barn med hjärtsjukdom, arrytmier och liknande besvär.

Klonidin ska ges med försiktighet vid hypovolemi eller hypotension då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Referens/Länk

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn , Hämtat: 2015-10-20

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-20 11:37:14
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-06 10:52:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3357
Versionsnummer: 1.0
Giltig fr o m: 2015-11-06 10:52:19
Utskriftsdatum: 2015-11-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klonidin oralt 20 mikrog/mL

(Extempore)

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Seding och analgesi vid ingrepp och undersökningar, Hämtat: 2015-11-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDE680B4D011CD1068C1257A310040C5F5?>

Rekommendation ,(Grade 2A), Hämtat: 2015-11-06

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Substansspecifika uppgifter

Clonidine hydrochloride, N02CX02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCVU9U50VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-20 11:37:14
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-06 10:52:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3357
Versionsnummer: 1.0
Giltig fr o m: 2015-11-06 10:52:19
Utskriftsdatum: 2015-11-06

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

