



Fenobarbital oralt

(Fenemal) tablett(er)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Fenemal tablett(er) 15 mg, 50 mg, 100 mg

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, Stänk på huden kan ge rodnad och irritation. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

ÖVRIG INFORMATION

Koncentrationsbestämning bör göras vid t.ex. terapisvikt, misstänkta biverkningar samt vid doshöjning/dosminskning. Riktvärde för plasmakoncentrationen fenobarbital vanligen 45 - 130 mikromol/L.

Fenobarbital är en potent inducerare av flera CYP-enzymer bl.a. CYP3A4 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Fenobarbital har 100 % biotillgänglighet efter oral tillförsel, vilket innebär att samma dos kan ges peroralt som intravenöst.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Initial dos: 2,5 mg/kg x 2 alternativt 5 mg/kg x 1

Behandlingen styrs sedan utifrån klinisk effekt, biverkningar och plasmakoncentrationen av fenobarbital. Stora interindividuella skillnader finns, viktigt med individuell dosering. Vanlig underhållsdos är dock 5 - 8 mg/kg/dygn.

Om dosen ges en gång dagligen ges den vanligtvis vid sänggåendet.

Vid dosering 2,5 mg/kg är tabletterna lämpliga att ge från 6 kg. Som alternativ finns Fenobarbital APL oral lösning 5 mg/mL.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/#3359>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-02-07 16:06:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:17:49

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3359

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:17:49

KONTROLLERA ALLTID ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFTEN GJORDES