



Klonazepam oralt

(Iktorivil) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Iktorivil tabletter 0,5 mg och 2 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen. Tablett 0,5 mg kan delas i två lika delar (0,25 mg/del) och tablett 2 mg kan delas i två (1 mg/del) eller fyra (0,5 mg/del) lika delar.

Alternativt kan klonazepam orala droppar användas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klonazepam (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Gäller båda tablettstyrkorna.

ÖVRIG INFORMATION

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för biverkningar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/dygn, max 1 mg/dygn.

Titra sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/dygn

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/dygn = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/dygn = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-02-13 16:59:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-14 09:41:42

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3360

Versionsnummer, major: 4

Giltig fr o m: 2018-02-14 09:41:42

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT