



# Klonazepam oralt

(ex Iktorivil) tabletter

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 0,5 mg och 2 mg

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen. Tablett 0,5 mg kan delas i två lika delar (0,25 mg/del) och tablett 2 mg kan delas i två (1 mg/del) eller fyra (0,5 mg/del) lika delar. Alternativt kan klonazepam orala droppar användas, se annan instruktion.

## ÖVRIG INFORMATION

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för biverkningar.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Klonazepam (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda tablettstyrkorna.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/dygn, max 1 mg/dygn.

Titrera sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.  
Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/dygn

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/dygn = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/dygn = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-09-21

ePedID: 3360

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-21

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-09-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**