



Klonazepam oralt

(ex Iktorivil) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 0,5 mg och 2 mg (Iktorivil, Rivotril licens)

Klonazepam finns även som orala droppar 2,5 mg/mL (licens), se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Tablett 0,5 mg kan delas i två lika stora doser.

Tablett 2 mg har krysskåra och kan delas i två eller fyra lika stora doser.

Oralt

Enteralt:

Tabletterna kan slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klonazepam (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda tablettstyrkorna och även för licensprodukterna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

För doser under 0,25 mg bör orala droppar användas, se annan instruktion.

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/DYGN, max 1 mg/DYGN.

Titra sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/DYGN

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/DYGN = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/DYGN = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

Krampprofylax i samband med busulfankonditionering

Barn under 10 kg: 0,1 mg x 3

Barn 10 - 29 kg: 0,2 mg x 3

Barn 30 - 49 kg: 0,25 mg x 3

Barn från 50 kg: 0,5 mg x 3

I vissa konditioneringscheman dubblas dosen ovan.

Behandlingen påbörjas kvällen innan eller från första busulfan-dagen och pågår till och med dagen efter avslutad behandling med busulfan. Följ lokal riktlinje i första hand.

ÖVRIG INFORMATION

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för biverkningar.





Klonazepam oralt

(ex Iktorivil) tablettor

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3360

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3360

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT