



Metronidazol oralt

(ex Flagyl) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 200 mg och 400 mg (Flagyl)
Filmdragerad tablett 250 mg och 500 mg (Metronidazol Actavis)

Metronidazol finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Tablett 250 mg och 500 mg kan delas i två lika stora doser. Tablett 400 mg och 200 mg bör sväljas hela.

Enteralt i sond:

Tabletterna kan krossas och lösas i vatten för administrering i jejunum, men i första hand bör annan antibiotikaterapi övervägas. Tänk på exponeringsrisken för antibiotikadamm vid tablettkrossning. För administrering i nasogastrisk sond/gastrostomi rekommenderas den orala suspensionen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metronidazol (registrerad produkt)

500 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller även 250 mg.

200 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C, gäller även 400 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med anaeroba bakterier känsliga för metronidazol

Barn 2 mån - 18 år:

7,5 mg/kg x 3, max 500 mg x 3 eller 20 - 30 mg/kg x 1, max 1,2 g x 1

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas upp till 40 mg/kg/dygn, max 2 g/dygn

Behandlingstid: 5 - 14 dagar beroende på indikation. För infektion med

Clostridium difficile 10 - 14 dagar. Dentala infektioner 5 - 7 dagar.

Profylax i samband med operation

Barn 2 mån - 18 år: 20 mg/kg, max 1 g

Ges som engångsdos 1 - 2 timmar innan operationen startar.

Urogenitala infektioner så som Trichomonas vaginalis eller bakteriell vaginos

Barn 2 mån - 9 år:

5 - 10 mg/kg x 3 eller 7,5 - 15 mg/kg x 2 eller engångsdos 40 mg/kg, max 2 g

Barn 10 - 18 år:

200 mg x 3 eller 400 mg x 2 eller 2 g som engångsdos

Behandlingstid om ej engångsdos: 5 - 7 dagar

Amöbiasis

Barn 2 mån - 18 år: 15 mg/kg x 3, max 800 mg x 3

Behandlingstid: 5 - 10 dagar

Giardiasis

Barn 2 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 400 mg x 3

Behandlingstid: 6 dagar





Metronidazol oralt

(ex Flagyl) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eradikering av *Helicobacter pylori*

Barn 2 mån - 18 år:

Som del i trippelbehandling eller sekvensbehandling:

10 mg/kg x 2, max 1 g/dygn

Behandlingstid:

Trippelbehandling: 7 - 14 dagar

Sekvensbehandling: 5 dagar (total behandlingstid 10 dagar)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi,
Hepatologi och Nutrition - *Helicobacter pylori* hos barn

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-01-16

ePedID: 3361

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-01-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT