



## Furosemid intravenös inf 2 mg/mL

(ex Furix)

**Överväg kaliumsparande diuretika alternativt kaliumsubstitution som tilläggsbehandling.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Denna instruktion gäller främst vid kontinuerlig infusion.

### EN-STEGSSPÄDNING

Furosemid		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
10 mg/mL	+	mg/mL	=	<b>2 mg/mL</b>
2 mL		8 mL		10 mL

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig)

Intravenös infusion: under 10 - 30 (- 60) min. Vid oligouri ges högre doser under 2 - 4 tim, se denna indikation.

Infusionshastigheten får ej överstiga 0,5 mg/kg/min pga risk för ototoxicitet. Exempelvis:  
1 mg/kg ges på minst 2 min  
5 mg/kg ges på minst 10 min

### RIMLIG DOS FÖR 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg/tim	-	0,12 mL/tim	0,25 mL/tim	1,25 mL/tim
0,4 mg/kg/tim	0,2 mL/tim	1 mL/tim	2 mL/tim	10 mL/tim
0,5 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
1 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Högre doser kan krävas vid sämre GFR och/eller uttalad proteinuri.

#### Övervätskning/Urindrivande

Gäller även vid bronkopulmonell dysplasi (BPD), hjärtsvikt, njursvikt, vid nefrotiskt syndrom utan hypovolemi, hypertoni hos njurtransplanterade patienter samt som profylax vid volymbelastning av t.ex blodprodukt.

Kontinuerlig infusion

Nyfödda: (0,05 -) 0,5 (- 1) mg/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: (0,05 -) 0,1 - 0,4 (- 2) mg/kg/tim

Intermittent

Nyfödda (prematurfödda): Initialt 0,5 - 1 mg/kg x 1

Nyfödda (fullgångna): Initialt 0,5 - 1 mg/kg x 1 - 3

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 - 0,5 (- 2) mg/kg x 2 - 4

Max 12 mg/kg/DYGN, gäller främst vid njursvikt. Övriga indikationer kräver sällan så höga maxdoser.

### ÖVRIG INFORMATION

Samtidig användning med aminoglykosider kan ge en additiv oto- och/eller nefrotoxicitet.

Furosemid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat.





## Furosemid intravenös inf 2 mg/mL

(ex Furix)

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Furosemid (registrerad produkt)

2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt. Resterande lösning får ej sparas.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12719883>

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Nefrotiskt syndrom

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3363](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3363)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-12-28

ePedID: 3363

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-01-09

Versionsnummer, major: 8

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-01-09

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**