

Kaliumjodid oralt 65 mg

Administreringsätt

Oralt: För barn som inte kan svälja tabletter kan tablettens krossas och slamas upp med vatten, juice eller dylikt.
Tabletten kan även tuggas.
Tabletten har krysskåra.

Vanlig indikation och dos

Inför MIBG - Scintigrafi

Barn under 1 månad: 0,25 tablett 1 timme före tillförel av isotop

Barn 1 mån - 12 år: 0,5 tablett 1 timme före tillförel av isotop

Barn över 12 år: 1 tablett 1 timme före tillförel av isotop

Övrig information

Tabletterna kan även inom hållbarhetstiden bli guldfärgade. Detta påverkar dock inte tabletternas effekt.

Referens/Länk

FASS Kaliumjodid, Hämtat: 2015-11-10

<http://www.fass.se/LIF/product76&userType=2&nplid=19960207000051&docType=6>

Personlig kontakt Nuklearmedicin, Hämtat: 2015-11-10

Rekommendation (Grade 1C), Hämtat: 2015-11-10

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Potassium iodide, V03AB21

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-10 10:50:04

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:55:26

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3364

Versionsnummer: 1.0

Giltig fr o m: 2015-11-25 13:55:26

Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

