



Kaliumjodid oralt 65 mg

tablett

ADMINISTRERING

Oralt: För barn som inte kan svälja tablett kan tablett tuggas, krossas och/eller slammas upp med vatten, juice eller dylikt. Om tablett löses upp ska lösningen intas direkt efter iordninställandet. Hållbarhetsstudier saknas för upplöst kaliumjodid.

Tablett har krysskåra och kan delas i två eller fyra lika stora doser.

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kaliumjodid (registrerad produkt)

65 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Tabletterna kan även inom hållbarhetstiden bli guldfärgade. Detta påverkar dock inte tabletternas effekt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inför MIBG-scintigrafi

Barn 1 mån - 3 år: 0,5 tablett vid varje tillfälle

Barn 4 - 12 år: 1 tablett vid varje tillfälle

Barn 13 - 18 år: 2 tablett vid varje tillfälle

Tillfälle = dagen före injektion, injektionsdagen av isotopen, samt dagen efter injektionen.

ÖVRIG INFORMATION

MIBG-scintigrafi = meta-iodobenzylguanidin-scintigrafi

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 3364

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-04-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT