



Palonosetron intravenös inf/inj 250 mikrog/5 mL = 50 mikrog/mL

(ex Aloxi)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Intravenös infusion/injektionslösning 50 mikrog/mL.

Observera att förpackningen TOTALT innehåller 250 mikrog dvs. 250 mikrog/5 mL vilket motsvarar 50 mikrog/mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Ordinerad dos kan sättas till önskad mängd NaCl 9 mg/mL för att få en mer hanterbar volym vid infusion.

Intravenös injektion/infusion: under 1 - 2 (- 15) min

Påbörjas ca 30 min innan cytostatikabehandling.

RIMLIG DOS för Palonosetron intravenös inf/inj 250 mikrog/5 mL = 50 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mikrog/kg	-	-	4 mL	20 mL
250 mikrog/DOS	-	-	5 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aloxi (registrerad produkt)

50 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För engångsbruk. Kassera eventuell överbliven mängd.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling

Barn 1 mån - 18 år:

Hög emetogen risk

20 mikrog/kg, max 250 mikrog. Ges 1 gång var 3:e dag.

ÖVRIG INFORMATION

Enligt produktresumén är maxdosen för barn 1500 mikrog. I den nationella riktlinjen för hantering av illamående och kräkningar ska dock dosen palonosetron inte överskrida 250 mikrog var tredje dag. Vid behov av ytterligare antiemetisk effekt ges istället vanligen palonosetron i kombination med andra läkemedel.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardprogram-pho/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3384

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-10-23

ePedID: 3384

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-27

Versionsnummer, major: 7

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT