

Valproat oralt, lösning 60 mg/mL (Absenor, Ergenyl)

Kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år.

Observera att Absenor oral lösning och Ergenyl oral lösning inte är utbytbara med varandra.

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Oralt: Kan ges i samband med måltid för att minska eventuella magbiverkningar.
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Epilepsi

Nyfödda

Initial behandling: 20 mg/kg x 1, underhållsdos 10 mg/kg x 2

Mycket begränsad information om dosering till nyfödda. Behandla alltid i samråd med barnneurolog.

Barn 1 mån - 11 år:

Initial behandling: 10 - 15 mg /kg x 1 eller 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 600 mg per dos.

Öka i steg om 75 - 150 mg/dygn var 3:e dag till anfallsfrihet.

Underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2

Ungdomar 12 - 18 år:

Initialt behandling: 600 mg x 1 eller 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag

Underhållsdos 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 14:47:35
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:29:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3385
ID/spårnummer: 1547
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:29:28
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt, lösning 60 mg/mL (Absenor, Ergenyl)

Infantil spasm

Dos upp till 30 mg/kg x 2 har använts.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,17 mL	0,8 mL	1,7 mL	8,3 mL
15 mg/kg	0,25 mL	1,2 mL	2,5 mL	12,5 mL

Hållbarhet preparat:

Valproinsyra (Registrerad Produkt)

● 60 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Båda lösningarna (Absenor respektive Ergenyl) har hallon-körsbärsmak och de innehåller konserveringsmedel samt etanol.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-06-03

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-06-03

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011, Hämtat: 2016-09-23

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%c3%a4rken.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningsstöd barnepilepsi, Hämtat: 2016-09-23

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

NeoFax , Hämtat: 2016-09-15

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 14:47:35

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:29:28

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3385

ID/spårnummer: 1547

Giltig fr o m: 2016-09-28 10:29:28

Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt, lösning 60 mg/mL **(Absenor, Ergenyl)**

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-09-20

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-23 14:47:35
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:29:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3385
ID/spårnummer: 1547
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:29:28
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

