



## Adrenalin intravenös inf

spädning till 20 mikrog/mL

**OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.**

### EN-STEGSSPÄDNING till 20 mikrog/mL

|           |   |                            |   |                     |
|-----------|---|----------------------------|---|---------------------|
| Adrenalin |   | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 |   | INF                 |
| 1 mg/mL   | + | mg/mL                      | = | <b>20 mikrog/mL</b> |
| 2 mL      |   | 98 mL                      |   | 100 mL              |

### EN-STEGSSPÄDNING till 20 mikrog/mL

|                      |   |                            |   |                     |
|----------------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| Adrenalin MARTINDALE |   | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 |   | INF                 |
| 0,1 mg/mL            | + | mg/mL                      | = | <b>20 mikrog/mL</b> |
| 20 mL                |   | 80 mL                      |   | 100 mL              |

### ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig): i central infart

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypotension

Nyfödda: 0,02 - 0,5 (- 1) mikrog/kg/min

Barn 1 mån - 18 år: 0,02 - 0,5 (- 1) mikrog/kg/min

Börja på 0,1 mikrog/kg/min och justera till önskad effekt.

### RIMLIG DOS FÖR 20 mikrog/mL

|                    | 1 kg        | 5 kg       | 10 kg      | 50 kg     |
|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 0,02 mikrog/kg/min | 0,06 mL/tim | 0,3 mL/tim | 0,6 mL/tim | 3 mL/tim  |
| 0,1 mikrog/kg/min  | 0,3 mL/tim  | 1,5 mL/tim | 3 mL/tim   | 15 mL/tim |
| 0,5 mikrog/kg/min  | 1,5 mL/tim  | 7,5 mL/tim | 15 mL/tim  | 75 mL/tim |

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-12-12

ePedID: 3387-664

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-19

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**



## Adrenalin intravenös inf

spädning till 20 mikrog/mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Adrenalin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Adrenalin Mylan ska förvaras vid 2 - 8 °C. Hållbar 12 mån i högst 25 °C.

Adrenalin Bradex ska förvaras i högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

#### Adrenalin MARTINDALE (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvara ampullerna i ytterkartongen.

Ljuskänsligt.