

Adrenalin intravenös inf

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Denna instruktion gäller spädningar från Adrenalin 1 mg/ml.

Tillgängliga beredningsformer och spädningar

- Spädning till Adrenalin 4 mikrog/mL 1 - 2 kg
SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3387-875.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387-875.pdf>
- Spädning till Adrenalin 10 mikrog/mL 2 - 10 kg
SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3387-876.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387-876.pdf>
- Spädning till Adrenalin 40 mikrog/mL 10 - 20 kg
SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3387-888.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387-888.pdf>
- Spädning till Adrenalin 80 mikrog/mL 20 - 80 kg
SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3387-957.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387-957.pdf>
- Spädning till Adrenalin 160 mikrog/mL Över 80 kg
SLL: <http://slleped01.ds.sll.se/eped/3387-958.pdf>
Sjunet: <http://eped.sll.sjunet.org/eped/3387-958.pdf>

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda.

Administreringsätt

Intravenös infusion (kontinuerlig)

Vanlig indikation och dos

Hypotension

0 - 18 år: 0,02-0,5 (-1) mikrog/kg/min

Börja på 0,1 mikrog/kg/min och titrera till önskad effekt.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-11-14 14:23:59
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-14 14:24:24
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3387
ID/spårnummer: 1716
Giltig fr o m: 2016-11-14 14:24:24
Utskriftsdatum: 2016-11-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

