

Valproat oralt, droppar 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl)

Kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år.

Observera att Absenor orala droppar och Ergenyl orala droppar inte är utbytbara med varandra.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Oralt:

Kan ges på sked tillsammans med t.ex. fruktmos. Kan ges i samband med måltid för att minska eventuella magbiverkningar. Dropparna har besk smak.

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Epilepsi

Nyfödda

Initial behandling: 20 mg/kg x 1, underhållsdos 10 mg/kg x 2

Mycket begränsad information om dosering till nyfödda. Behandla alltid i samråd med barnneurolog.

Barn 1 mån - 11 år:

Initial behandling: 10 - 15 mg /kg x 1 eller 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 600 mg per dos.

Öka i steg om 75 - 150 mg/dygn var 3:e dag till anfallsfrihet

Underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2

Ungdomar 12 - 17 år:

Initialt behandling: 600 mg x 1 eller 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag

Underhållsdos 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 14:55:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:27:02
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 1546
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:27:02
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt, droppar 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl)

Infantil spasm

Dos upp til 30 mg/kg x 2 har använts.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,05 ml	0,2 ml	0,5 ml	2,5 ml
15 mg/kg	0,08 ml	0,4 ml	0,8 ml	3,8 ml

Hållbarhet preparat:

Valproinsyra (Registrerad Produkt)

● 200 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-06-14

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclibrary/current/>

FASS , Hämtat: 2016-06-14

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011, Hämtat: 2016-09-23

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%3a4rken.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningstöd barnepilepsi, Hämtat: 2016-09-23

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

NeoFax , Hämtat: 2016-09-15

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-09-28

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-23 14:55:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:27:02

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390

ID/spårnummer: 1546

Giltig fr o m: 2016-09-28 10:27:02

Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt, droppar 200 mg/mL **(Absenor, Ergenyl)**

Substansspecifika uppgifter

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-23 14:55:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 10:27:02
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 1546
Giltig fr o m: 2016-09-28 10:27:02
Utskriftsdatum: 2016-09-28

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

