

Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl), orala droppar

Kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år.

Observera att Absenor orala droppar och Ergenyl orala droppar inte är utbytbara med varandra.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Oralt:

Kan ges på sked tillsammans med t.ex. fruktmos. Kan ges i samband med måltid för att minska eventuella magbiverkningar. Dropparna har besk smak.

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Epilepsi

Nyfödda

Initial behandling: 20 mg/kg x 1, underhållsdos 10 mg/kg x 2

Mycket begränsad information om dosering till nyfödda. Behandla alltid i samråd med barnneurolog.

Barn 1 mån - 11 år:

Initial behandling: 10 - 15 mg /kg x 1 eller 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 600 mg per dos.

Öka i steg om 75 - 150 mg/dygn var 3:e dag till anfallsfrihet

Underhållsdos: 10 - 20 mg/kg x 2

Ungdomar 12 - 17 år:

Initialt behandling: 600 mg x 1 eller 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag

Underhållsdos 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-01-16 13:53:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-16 13:53:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390

ID/spårnummer: 1851

Giltig fr o m: 2017-01-16 13:53:25

Utskriftsdatum: 2017-01-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt 200 mg/mL

(Absenor, Ergenyl), orala droppar

Infantil spasm

Dos upp till 30 mg/kg x 2 har använts.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg		0,25 ml	0,5 ml	2,5 ml
15 mg/kg		0,38 ml	0,75 ml	3,75 ml

Hållbarhet preparat:

Valproinsyra (registrerad produkt)

200 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%3a4rken.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningsstöd barnepilepsi

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-01-16 13:53:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-16 13:53:25
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 1851
Giltig fr o m: 2017-01-16 13:53:25
Utskriftsdatum: 2017-01-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt 200 mg/mL
(Absenor, Ergenyl), orala droppar

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-01-16 13:53:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-16 13:53:25
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 1851
Giltig fr o m: 2017-01-16 13:53:25
Utskriftsdatum: 2017-01-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

