

Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl), orala droppar

Behandla alltid i samråd med barnneurolog. Särskild försiktighet till små barn med epilepsi av oklar orsak. Se Övrig information.

Observera att Absenor orala droppar och Ergenyl orala droppar inte är utbytbara med varandra.

Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Oralt:

Kan ges på sked tillsammans med t.ex. fruktmos. Kan ges i samband med måltid för att minska eventuella magbiverkningar. Dropparna har besk smak.

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Vid behandling med orala droppar kan det vara en fördel med 2 - 3 doseringstillfällen per dag för att minska risken för magbiverkningar.

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-03-31 11:32:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-31 14:07:20
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 3056
Giltig fr o m: 2017-03-31 14:07:20
Utskriftsdatum: 2017-04-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl), orala droppar

Epilepsi

Nyfödda:

Mycket begränsad information om dosering finns.

Vid behov av snabb behandlingseffekt: bolusdos 20 mg/kg, därefter underhållsdos

Underhållsdos: 10 mg/kg x 2

Underhållsdosen justeras utifrån effekt och biverkningar och med stöd av serumkoncentration av valproat.

Barn 1 mån - 11 år:

Startdos: 5 - 7,5 mg/kg x 2, max 300 mg x 2

Primär måldos: 20 - 30 mg/kg/dygn som kan uppnås via dosökning var 3:e dag med 5 - 10 mg/kg/dygn. I vissa fall kan högre dygnsdoser i intervallet 30 - 60 mg/kg/dygn vara av värde.

Underhållsdosen justeras utifrån effekt och biverkningar och med stöd av serumkoncentration av valproat.

Barn 12 - 18 år:

Startdos: 300 mg x 2

Öka i steg om 150 - 300 mg var 3:e dag till lämplig underhållsdos utifrån effekt och biverkningar och med stöd av serumkoncentration av valproat.

Vanlig underhållsdos: 500 - 1000 mg x 2, max 2,5 g dagligen

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg		0,12 ml	0,25 ml	1,25 ml
10 mg/kg		0,25 ml	0,5 ml	2,5 ml

Hållbarhet preparat:

Valproinsyra (registrerad produkt)

200 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

Valproat är kontraindicerat vid vissa ämnesomsättningsjukdomar, fr.a. mitokondriella sjukdomar relaterade till mutationer i POLG-genen, liksom vid

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-31 11:32:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-31 14:07:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3390

ID/spårnummer: 3056

Giltig fr o m: 2017-03-31 14:07:20

Utskriftsdatum: 2017-04-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor, Ergenyl), orala droppar

leversjukdom eller signifikant leverfunktionsnedsättning.

Valproat kan ge leverskada, störst risk för barn under 3 år. Kontroll av leverfunktionen ska göras före behandlingsstart samt under de 6 första behandlingsmånaderna.

Behandling med valproat ger hög risk för missbildningar och/eller utvecklingsstörning hos foster. Därför ska flickor i fertil ålder endast behandlas med valproat om andra behandlingsalternativ saknas.

Valproat interagerar med ett flertal läkemedel, bl.a. med andra läkemedel mot epilepsi. Effekten kan bli ökad eller minskad plasmakoncentration av andra läkemedel, men även ökad eller minskad koncentration av valproat. Se FASS för mer information.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi 2011

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/2011_02_02_Rek%20Epilepsi-webb_bokm%c3%a4rken.pdf

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Handläggningsstöd barnepilepsi

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sextonepilepsi.pdf>

NeoFax

Personlig kontakt Tommy Stödberg, MD, Neuropediatrik, ALB

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Valproic acid, N03AG01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC1U973RVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-03-31 11:32:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-31 14:07:20
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3390
ID/spårnummer: 3056
Giltig fr o m: 2017-03-31 14:07:20
Utskriftsdatum: 2017-04-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

